

# HIDROCORTISONA ACEPONATO 0,584 MG/ML

Antiinflamatorios - Solución Spray



REG. SAG N° 2164

## COMPOSICIÓN

Cada 1 mL de producto contiene:  
Hidrocortisona aceponato (HCA) 0,584 mg  
Excipientes c.s.p. 1,0 mL

## ESPECIES DE DESTINO

Perros.

## INDICACIONES DE USO

Tratamiento sintomático de dermatitis inflamatorias y pruriginosas en perros.

## DOSIFICACIÓN, VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Dosificación: 1,52 µg de Hidrocortisona aceponato/cm<sup>2</sup> de piel, cada 24 horas, durante 7 días consecutivos (2 atomizaciones de Hidrocortisona aceponato 0,584 mg/mL para una superficie de piel de 10 cm x 10 cm/día).

Vía de administración: Uso Tópico, cutáneo

Modo de empleo: Colocar el atomizador en la boca del frasco.

Aplicar pulsando el atomizador, a una distancia de 10 cm de la zona de piel a tratar, sin necesidad de realizar ningún masaje.

Si es necesario rociar la cara, cubrir los ojos del animal.

Si no hay mejoría luego de 7 días de tratamiento, el Médico Veterinario a cargo deberá re-evaluar prolongar el tratamiento, en cuyo caso el perro deberá ser sometido a controles periódicos.

## ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

**Mantener fuera del alcance de los niños y otros animales domésticos.**

La superficie corporal tratada no debiera exceder una correspondiente a – por ejemplo – los dos flancos desde la columna a las líneas mamarias, incluyendo hombros y muslos. De otra forma, usar sólo de acuerdo a la evaluación riesgo/beneficio y someter al perro a evaluaciones clínicas regulares.

En caso de infecciones bacterianas, micóticas o parasitarias, se debe realizar un control de éstas mediante el tratamiento adecuado, bajo prescripción del Médico Veterinario.

En pacientes con Hiperadrenocorticismo (Síndrome de Cushing) y en aquellos menores a 7 meses de edad, el uso de Hidrocortisona aceponato 0,584 mg/mL está condicionado por la evaluación de la relación riesgo/beneficio que realice el Médico Veterinario tratante.

## CONTRAINDICACIONES

No utilizar en animales con hipersensibilidad conocida a Hidrocortisona.

No aplicar en zonas con úlceras cutáneas.

No aplicar en hembras preñadas o durante la lactancia.

## EFFECTOS ADVERSOS Y REACCIONES ADVERSAS

Reacciones locales transitorias en el sitio de aplicación (eritema y/o prurito), pueden ocurrir en casos muy raros.

## CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Mantener a temperatura ambiente, entre 15 y 30 °C, en su envase original, bien cerrado, protegido de la luz solar y fuentes de ignición.

## PRESENTACIÓN

Frasco con 76 mL de producto.

**Venta bajo Receta Médico Veterinaria.**

## USO VETERINARIO

FT0163NAC15122020R1V1

